

Core Biopsy de Mama

O uso de antiagregantes plaquetários, como ácido acetilsalicílico (Aspirina®, AAS®, Melhoral®, Bufferin®, etc.), clopidogrel (Plavix®) e Ticlopidina (Ticlid®) deve ser suspenso 48 horas antes do exame, mas somente com o consentimento e supervisão do médico assistente.

— O uso de anticoagulantes deverá apenas ser informado ao médico do Setor de Imagem antes do procedimento.

— Caso necessite recorrer a analgésicos, poderá tomar dipirona (Novalgina®) ou paracetamol (Tylenol®), na dosagem habitual.

— No dia do exame, é necessário comparecer de sutiã justo e blusa abotoada na frente.

Observações:

- Chegar 30 minutos antes do horário marcado.
- Trazer carteirinha do convênio, documento de identidade e CPF.

Consultas • Diagnósticos • Tratamentos

☎ 11 4979.7333
📞 11 99748.9948

www.casadaesperanca.com.br

Centro de Diagnóstico
Av. Dr. Alberto Benedetti, 533
Vl. Assunção - Santo André - SP
CEP: 09030-340

Centro Neurológico
Travessa Apeninos, 106
Vl. Santa Tereza - Santo André - SP
CEP: 09030-380

Rotary 
Club de Santo André

A Casa da Esperança foi fundada e é administrada por Diretores Voluntários do Rotary Club de Santo André